


Op 19 mei heb ik weer een poging gedaan de vis op de Brink te lokaliseren. De buitentemperatuur 19°C, weinig wind en een watertemperatuur van alweer 16°C. Ik heb de gegevens van vorig jaar nog eens nagekeken en ook toen bedroeg de watertemperatuur rond deze tijd 16°C.

Ook nu hebben we alle bekende stekken waar zich normaal vis bevindt afgevaard en onderzocht. Het water is weer helderder geworden en helaas was op de visfinder te zien dat de plantengroei zich langzaam weer begint te ontwikkelen. Het is overigens niet overal helder, daar waar de fabriek zijn spoelwater inlaat was het aanmerkelijk troebeler. Vorige maand gaf ik aan dat ik over het algemeen minder vis gezien heb dan in voorgaande jaren. Ook deze tour leverde minder vis waarnemingen op dan normaal.

Alleen in het diepe gedeelte, in het midden van de plas, lag wel vis. Deze vis lag niet meer zo strak tegen de bodem aan maar lag verspreid tussen de 8m en 24m.

Tegenover visplateau 24 was een school met wat grotere vis zichtbaar, zie de afbeelding hieronder. Hierop is goed te zien hoe de verschillende sonar mogelijkheden dezelfde vis weergeven. Rechtsboven is het z.g. 2D sonarbeeld, daaronder links is het Down image beeld en rechts daarnaast het Side image beeld.



De populatie graskarpers heeft zich aardig hersteld, we zagen nog wel een aantal viskadavers maar we hebben ook 2 grotere scholen graskarpers gezien die er redelijk uitzagen en zich op een heel andere locatie bevonden dan vorige maand.

In tegenstelling tot 2 weken geleden hebben we helemaal geen karpers in de oppervlakte waargenomen.

Tot de volgende keer.