



Op 10 juli 2015 is er weer een rondje Brink gemaakt. De buitentemperatuur en de temperatuur van het oppervlaktewater waren gelijk namelijk: 23°C. Er stond een matig windje uit ZW. Ook was er weinig bewolking. De helderheid van het water verschilde per plaats. De kleine Brink was compleet troebel door het water wat geloosd werd vanuit de fabriek. Bij de ingang van de kleine Brink was veel plantengroei, verder was er wat lichte plantengroei verspreid over de bodem. het water was door algenbloei in de ondiepere gedeeltes (zuidkant) redelijk troebel vanaf 2m diep. De plantengroei in het zuidelijke gedeelte is aardig toegenomen, op dieptes van 0 tot ca. 3,5m staan de planten al bijna tot aan het oppervlak. Dit is natuurlijk slecht voor de hengelaar maar weer goed voor het jongbroed. Dit jongbroed hebben we trouwens weer in grote hoeveelheden waargenomen.




*Figuur 1 Grote wolk met jongbroed*




*Figuur 2 Wolk speldaas met daarachter baarzen*

We hebben verder vis gespot in de diepere gedeeltes tussen 7 en 22m, ook zagen veel vis in op het talud rond de zandberg bij de fabriek.



*Figuur 3 Groepen grotere vis talud zandberg*



Helaas geen positieve bevindingen voor de hengelaars, de grotere concentraties vis bevinden zich buiten bereik van de vaste stok en zelfs van de feeder, er zit sporadisch wel vis in de ondiepere gedeeltes maar die zijn dan ook nog moeilijk aan de schubben te komen.

Wat wel positief is, is dat als maar 50% van het speldas wat we gezien hebben de volwassenheid bereikt dan gaan we nog goede tijden tegemoet.

Tot de volgende keer.

*Figuur 4 De meeste vis in het zwarte deel*